HAWKER MAX 400 GR

Descripción Completa para el Carrito de Compras - Estándar Tecnogran

Campo Estructural	Contenido Técnico / Comercial
Nombre del producto	HAWKER MAX 400 GR
Tipo de producto	Insecticida mosquicida en polvo mojable (WP).
Principio activo	Acetamiprid 10%, con feromona Z-9 tricoseno y componentes azucarados atrayentes.
Plagas que controla	Mosca doméstica, mosca de los establos, moscas metálicas o cadavéricas y otras especies, incluyendo Drosophila, Phoridae y Psychodidae.
Modo de acción	Las moscas son atraídas por la feromona y los componentes azucarados, que estimulan su alimentación. El acetamiprid ejerce su acción insecticida principalmente por ingestión del cebo.
Método de aplicación	Como pintura: mezclar 200 g en 200 ml de agua tibia. Por pulverización: mezclar 200 g en 2 litros de agua. Ajustar la preparación y aplicación al marbete vigente.
Dónde aplicarlo	En sectores autorizados de granjas, comercios, viviendas, espacios exteriores, hospitales, escuelas, fábricas y hoteles, respetando las restricciones de la etiqueta.
Duración / residualidad	El catálogo destaca su acción residual, pero no especifica una duración en días o semanas. La persistencia depende de las condiciones de aplicación y debe consultarse en la etiqueta vigente.
Recomendaciones de uso	Dirigir el tratamiento a los sitios de reposo o concentración de moscas, de acuerdo con el marbete. Preparar únicamente la cantidad necesaria y complementar el control con medidas de higiene y manejo de focos.
Precauciones	Uso profesional. Utilizar elementos de protección personal; evitar el contacto con piel y ojos y la contaminación de alimentos, utensilios y cursos de agua. Seguir la etiqueta y la hoja de seguridad vigentes.
Apto para	Control profesional de moscas en los ámbitos y superficies expresamente autorizados por la etiqueta.
No aplicar en	Personas, animales, alimentos, utensilios, fuentes de agua ni superficies de contacto directo con alimentos. Evitar cualquier sitio no autorizado por el marbete.
Beneficio principal	Combina atracción mediante feromona y componentes azucarados con control insecticida por ingestión, permitiendo tratamientos focalizados con efecto residual.